

团 体 标 准

T/NTRPTA 0149.2—2025

绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第 2 部分：鲜 食蚕豆栽培技术规程

Green food: Characteristic Fresh Legume Vegetable
- Part 2: Technical Regulations for Cultivation of Vegetable Vicia Faba

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

江苏省农村专业技术协会 发 布
南通市农村专业技术协会

目 次

1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
4	产地环境要求	1
5	品种选择	1
6	种植时间	1
7	生产技术管理	1
7.1	种子精选	1
7.2	种子处理	1
7.3	整地施肥	1
7.4	播种方式和用种量	2
7.5	肥料管理	2
7.6	水分管理	2
7.7	摘心控旺	2
7.8	中耕除草	2
8	病虫害防治	2
9	采收	2
10	生产记录	2

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/NTRPTA 0149.2《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第2部分：鲜食蚕豆栽培技术规程》与T/NTRPTA 0149.1《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第1部分：鲜食大豆栽培技术规程》、T/NTRPTA 0149.3《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第3部分：四季豆栽培技术规程》、T/NTRPTA 0149.4《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第4部分：荷仁豆栽培技术规程》、T/NTRPTA 0149.5《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第5部分：利马豆栽培技术规程》、T/NTRPTA 0149.6《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第6部分：有害生物绿色防控技术规程》、T/NTRPTA 0149.7《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第7部分：冷链流通技术规程》、T/NTRPTA 0149.8《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第8部分：速冻加工技术规程》共同构成鲜食豆类特色蔬菜全产业链标准体系。

本文件是T/NTRPTA 0149《绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜》第2部分。T/NTRPTA 0149已经发布了以下部分。

——第1部分：鲜食大豆栽培技术规程。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏沿江地区农业科学研究所提出。

本文件由南通市农村专业技术协会归口。

本文件起草单位：江苏沿江地区农业科学研究所、南通市农村专业技术协会、南通科技职业学院。

本文件主要起草人：李进、尹升华、翟彩娇、葛礼姣、程玉程。

绿色食品 鲜食豆类特色蔬菜第2部分：鲜食蚕豆栽培技术规程

1 范围

本文件规定了鲜食蚕豆的产地环境要求、品种选择、种植时间、生产技术管理和采收的管理要求。本文件适用于南通或同类生态区鲜食蚕豆栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- GB 4404.2 粮食作物种子 第2部分：豆类
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- DB62/T 1120 绿色食品 蚕豆生产技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

鲜食蚕豆 Vegetable Vicia Faba

以收获鲜荚或籽粒为目的的蚕豆。

4 产地环境要求

产地环境符合NY/T 391的规定。选择生态条件良好、远离污染源、土壤耕作层疏松、理化性状良好、地势平坦、排灌方便、土壤肥沃、有机质含量高的地块为宜。

5 品种选择

选择抗病、优质、高产、抗逆性强、商品性好、适应本区域环境条件的优良鲜食蚕豆品种，如大白皮蚕豆、绿皮蚕豆、通蚕鲜7号、通鲜2号等。

6 种植时间

鲜食蚕豆于9月中下旬~10月中旬播种。

7 生产技术管理

7.1 种子精选

种子质量符合GB 4404.2标准。种子均匀饱满、无病斑、无霉烂、无虫蛀、无损伤。

7.2 种子处理

用50 %多菌灵可湿性粉剂500倍液浸种30 min，晾干后播种；或在播种前1 d~2 d，将种子摊薄在阴凉通风处晾晒4 h~5 h，增强种子活力。

7.3 整地施肥

选择土壤肥沃、疏松、排灌方便、光照充足的田块种植，避免与豆类作物连作。播前每667 m²施有机肥1 000 kg，15-15-15复合肥25 kg，深翻20 cm~25 cm后平整土地。垄宽1.0 m~1.2 m，垄高20 cm~30 cm。

肥料使用应符合NY/T 394的规定。

7.4 播种方式和用种量

采用穴播进行播种。鲜食蚕豆行距25 cm~30 cm，株距15 cm~20 cm，每穴播2粒~3粒，深度3 cm~4 cm，播后覆土镇压。每667 m²株数为1.5万株左右。鲜食蚕豆用种量因品种而异，每667 m²用种子量8 kg~10 kg。

7.5 肥料管理

在基肥充足情况下，根据植株长势适量追肥。开花期每667 m²施用氮钾复合肥15 kg~20 kg，每隔7 d追施一次，共2次~3次。同时，每隔10 d~15 d叶面喷施0.2 %磷酸二氢钾。

肥料使用应符合NY/T 394的规定。

7.6 水分管理

结荚期间，若遇干旱需勤浇水，保持土壤湿润。

7.7 摘心控旺

植株高度达50 cm~60 cm时，摘除顶端2 cm~3 cm嫩心，抑制徒长。

7.8 中耕除草

第一次除草在2片~3片真叶期进行，此时结合拔出弱苗、病苗进行除草；第二次除草在开花前期结合中耕培土进行除草。培土时，将土培至植株基部，增强抗倒伏能力。

8 病虫害防治

病虫害防治按DB62/T 1120规定执行。

9 采收

鲜食蚕豆以果荚鲜绿色，籽粒饱满，用手捏青荚籽粒不移动时即可采摘。

10 生产记录

建立生产档案，档案资料保存不少于2年。
